



OCTOBRE ROSE

Le dépistage du cancer du sein

60 % des cancers du sein sont détectés

à un stade précoce et 7,3 % le sont à un stade métastatique.

Près de 20 000 cancers du sein pourraient être évités chaque année.

SACHEZ QUE...

Dès **25 ans** (ou plus tôt en cas de facteurs de risque/ antécédents) : Un **examen clinique** (palpation) par un médecin, un gynécologue ou une sage-femme est recommandé **tous les ans**.

De **50 à 74 ans** (Dépistage organisé) : Une **mammographie tous les 2 ans**, associée à un examen clinique des seins, pris en charge à 100 % par l'Assurance Maladie (sans avance de frais). Chaque mammographie bénéficie d'une double lecture par des radiologues agréés.

**. 1ER OÙIL :
L'AUTO PALPATION**



L'auto-surveillance des seins

Etape 1 : L'examen visuel


Dès 25 ans et une fois par mois, j'examine mes seins quelques jours après mes règles.

En position debout, les mains sur les hanches, seins nus et devant un miroir, je regarde mes seins.

Je repère si j'ai une ou plusieurs anomalies comme :




Effet peau d'orange




Grosseur

Rétraction de la peau




Rétraction du mamelon

Rougeur persistante



Écoulement du mamelon



Dissymétrie anormale

Si je repère au moins une anomalie :

Je prends rendez-vous chez mon médecin, mon gynécologue ou ma sage-femme sans attendre.

Il me donnera un avis et me prescrira des examens si besoin.

L'auto-surveillance des seins



Etape 2 : Le toucher

Après l'examen visuel,
je palpe mes seins de la manière suivante :




1 Je palpe mon sein avec 3 doigts à plat:
l'index, le majeur et l'annulaire

2 Je lève le bras, en plaçant la main derrière la tête,
(j'utilise la main droite pour le sein gauche)
Je commence par l'extérieur du sein
en faisant de petits cercles en appuyant
avec mes 3 doigts.



3 Je passe sur tout le sein en finissant par le mamelon.
Arrivée au mamelon,
je le pince.

4 Je n'oublie pas de palper l'aisselle
et aussi la clavicule (l'os près de l'épaule),
le sternum (l'os au milieu des seins).



Une fois terminé, je lève l'autre bras
et je commence la palpation de l'autre sein.

Si je sens une grosseur ou que du liquide sort du mamelon :

Je prends rendez-vous chez mon médecin, mon gynécologue ou ma
sage-femme sans attendre. Il me donnera un avis et me prescrira
des examens si besoin.

ATTENTION : A partir de 25 ans, il est recommandé d'avoir une palpation par un
professionnel de santé, au moins une fois par an.

L'auto-examen des seins **ne remplace pas** la visite chez le médecin,
le gynécologue ou la sage-femme.

AIDE MÉMOIRE :
(si on ne pense pas à le faire chaque mois...)

**. À CHAQUE SAISON,
SA PALPATION**

